

Informacja o leku dla pacjenta.  
Należy zapoznać się z właściwościami leku  
przed zastosowaniem.



## ALBOTHYL®

(Policresulenum)

Globulki dopochwowe, 90 mg

### Skład

1 globulka zawiera:

**Substancja czynna:**

Polikrezulen 90 mg

**Substancje pomocnicze:**

Makrogol 4000, Makrogol 1500.

### OPIS DZIAŁANIA

Polikrezulen zawarty w preparacie działa wybiórczo na białka tkanek martwiczo i chorobowo zmienionych. Nie działa na tkanki zdrowe. Niskie pH preparatu niszczy bakterie, grzyby i pierwotniaki. Powodując silny skurcz naczyń hamuje krwawienie.

### WSKAZANIA

Miejscowe leczenie zapaleń, zakażeń i uszkodzeń tkanek pochwy i szyjki macicy:

- nadżerki części pochwowej szyjki macicy
- upławy, również pochodzenia bakteryjnego, rzęstkowego i grzybiczego
- zapalenia pochwy
- zapalenie szyjki macicy
- owrzodzenie wywołane uciskiem pesariów
- hamowanie krwawienia po biopsji lub usunięciu polipów macicy.

### PRZECIWSKAZANIA

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy stosować preparatu w czasie miesiączki.

### OSTRZEŻENIA I ZALECANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W przypadku poknięcia preparatu Albothyl globulki dopochwowe, należy natychmiast wypić dużą ilość wody i skontaktować się z lekarzem.

Preparat Albothyl globulki dopochwowe intensywnie pobudza proces gojenia. Nie

ma powodu do niepokoju, w przypadku oddzielania się martwiczych tkanek (nawet w dużych ilościach) od zmienionych chorobowo obszarów.

W czasie stosowania preparatu należy unikać używania do higieny intymnej mydeł, ze względu na ryzyko działania drażniącego.

W czasie leczenia należy zaniechać odbywania stosunków płciowych.

Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. W przypadku zetknięcia preparatu z oczami, należy natychmiast oczy przemyć wodą; może być konieczne przeprowadzenie konsultacji okulistycznej.

W przypadku zabrudzenia preparatem Albothyl globulki dopochwowe tkaniny czy skóry, należy natychmiast przemyć zabrudzone miejsce wodą, aby nie dopuścić do jego wyschnięcia.

Plamy widoczne na globulkach wynikają z naturalnego wyglądu podłoża globulek i nie wpływają na skuteczność preparatu.

### STOSOWANIE LEKU W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENTA PIERSIĄ

Preparat można zastosować w okresie ciąży lub karmienia piersią tylko ze ściśle określonych wskazań i po uwzględnieniu ryzyka dla matki i dziecka wynikającego z leczenia.

Brak danych na temat przenikania preparatu do mleka kobiet karmiących piersią.

### WPŁYW LEKU NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW, OBSŁUGĘ MASZYN I SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNĄ.

Nie wywiera wpływu.

### ODDZIAŁYWANIE Z INNYMI LEKAMI

Preparat jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Ponieważ nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia interakcji,

należy unikać stosowania dopochwowo innych leków w czasie leczenia preparatem Albothyl.

#### **DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA** **Stosować dopochwowo.**

W zależności od nasilenia objawów 1 globulka na dobę lub co drugi dzień.

Globulki należy stosować na noc. Dla ułatwienia podawania globulkę można przed użyciem na krótko zanurzyć w wodzie, a następnie wprowadzić głęboko do pochwy. Przed wprowadzeniem globulki należy położyć się na plecach. Stosowanie podpasek higienicznych umożliwia uniknąć zabrudzenia bielizny i pościeli.

W przypadku zastosowania u pacjentki w gabinecie lekarskim, w celu utrzymania leku we właściwym miejscu, należy zastosować tampon, który pacjentka musi usunąć po 1-2 godzinach od chwili wprowadzenia globulki.

Jeżeli po zastosowaniu jednego opakowania preparatu Albothyl nie nastąpiła poprawa lub w krótkim czasie po zakończeniu leczenia nastąpi nawrót objawów należy zasięgnąć porady lekarza.

#### **PRZEDAWKOWANIE**

Nie obserwowano objawów przedawkowania preparatu.

#### **DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE**

W pojedynczych przypadkach obserwowano występowanie miejscowych objawów podrażnienia na początku leczenia preparatem. Objawy te szybko ustępują. W przypadku wystąpienia poważnych, miejscowych objawów podrażnienia, należy przerwać stosowanie preparatu i zgłosić to lekarzowi prowadzącemu.

**Przed zastosowaniem należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować leku po upływie tego terminu.**

#### **PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### **DOSTĘPNE OPAKOWANIA**

6 globulek

#### **WYTWÓRCA**

ALTANA Pharma AG  
Byk-Gulden Strasse 2  
D-78467 Konstanz  
Niemcy

#### **DATA SPORZĄDZENIA ULOTKI**

Wrzesień 2002

#### **Szczegółowych informacji udziela:**

ZF ALTANA Pharma Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 146A,  
02-305 Warszawa,  
tel. 608 13 00, fax 608 13 03