

Informacja o leku dla pacjenta.
Należy zapoznać się z właściwościami leku
przed zastosowaniem.



Bioaron C[®]

**Phyto
Pharm**
LEKI ROŚLINNE

Syrop

Świad. Rej. MZIOS Nr R/0467

Skład: 100 ml preparatu zawiera: Aloe extractum fluidum (wyciąg z aloesu) – 38,4 g, Aroniae succus (sok z aronii) – 23,3 g, Vitaminum C – 1,02 g. Substancje pomocnicze: sacharozę – 65,28 g. Preparat zawiera 0,90 – 1,50% (m/m) witaminy C, co odpowiada przeciętnie 77 mg witaminy w dawce jednorazowej (5 ml).

Działanie: stosowanie syropu Bioaron C powoduje stymulację układu odpornościowego przez substancje obecne w wyciągu z liści aloesu drzewiastego. Stwierdzono, że preparat wpływa zarówno na odpowiedź humoralną, jak i komórkową, powoduje wzrost liczby limfocytów B i T oraz liczby przeciwciał krążących we krwi, w wyniku czego dochodzi do przywrócenia prawidłowej odpowiedzi układu immunologicznego. Pobudzenie osłabionej odporności organizmu ułatwia zwalczanie infekcji bakteryjnych i wirusowych.

Ponadto syrop Bioaron C zawiera witaminę C oraz sok z aronii, który także jest źródłem witamin i substancji mineralnych. Preparat przeznaczony jest dla dzieci. Podczas badań nad tolerancją stosowania syropu Bioaron C u dzieci stwierdzono, że preparat również pobudza apetyt.

Wskazania

Pomocniczo:

- w infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przeziębienia,
- w braku apetytu.

Profilaktycznie:

- w nawracających zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, rekonwalescencji organizmu po przebytych chorobach i antybiotykoterapii.

Przeciwwskazania: podobnie jak w przypadku innych produktów zawierających cukier nie zaleca się stosowania preparatu Bioaron C u chorych na cukrzycę, u osób z glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania, przy nietolerancji fruktozy lub u osób z niedoborem sacharazo-izomaltazy.

Dawkowanie i sposób użycia: jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, dzieci w wieku 3 – 6 lat: 2 razy dziennie po 5 ml (1 łyżeczka) preparatu przez 14 dni; powyżej 6 roku życia: 3 razy dziennie po 5 ml (1 łyżeczka) przed jedzeniem przez 14 dni. W braku apetytu 5 ml preparatu jednorazowo 15 min przed posiłkiem.

Przed zastosowaniem preparatu należy sprawdzić datę ważności podaną na etykiecie i pudełku kartonowym. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Ostrzeżenia specjalne i środki ostrożności dotyczące stosowania: dawka jednorazowa preparatu (5 ml) zawiera około 3,3 g sacharozę. Nie należy zmieniać dawkowania bez wskazań lekarza ani przekraczać zalecanego okresu stosowania.

Działania niepożądane: dotychczas nie stwierdzono.

Przechowywanie: preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dostępne opakowanie: flakon 100 ml.

Wytwórca

PhytoPharm Kłęka SA, Kłęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.
Informacje o leku można uzyskać pod numerem: **0801 13 11 22**

Data ostatniej weryfikacji ulotki: 18 sierpnia 2003 r.